

CACHORRO HUÉRFANO

Los cachorros son incapaces de controlar de una forma eficaz la temperatura corporal, durante sus primeras cuatro semanas de vida. Durante la primera semana de vida su temperatura corporal está directamente relacionada con la temperatura ambiente, se necesita una temperatura externa de 30°C a 32°C. Durante las siguientes 3 semanas la temperatura ambiente puede ser de 24°C. La humedad ha de mantenerse entre 55% y 60%.

La dieta recomendada Leche Royal Canin o Esbilac.

En el caso de Royal Canin Puppy Milk la cantidad de leche es un cazo raso por cada 20 ml de agua mineral. Se puede preparar la cantidad necesaria para un día y mantenerla en el frigorífico a 4°C, calentarla cuando se vaya a utilizar.

El cachorro ha de recibir.

* **Primera semana** : 3-10ml de leche reconstituida. Para perros de 1-10 kilos en edad adulta. y por toma . 6 tomas día.

5-20 ml de leche reconstituida. Para perros de 10-25 kilos en edad adulta y por toma 6 tomas al día

10-25 ml de leche reconstituida. Para perros de 25-45 Kilos en edad adulta. Y por toma 6 tomas al día

* **Segunda semana** : 10- 30 ml de leche reconstituida . Para perros de 1-10 kilos en peso adulto y por toma , 5 tomas al día.

15-50 ml de leche reconstituida. Para perros de 10 a 25 Kilos en peso adulta, por toma 5 tomas al día.

30-70 ml de leche reconstituida. Para perros de 25 a 45 kilos en edad adulta, por toma 5 tomas

* **Tercera semana** : 20-50 ml de leche reconstituida . Para perros de 1 a 10 kilos de peso adulto, por toma, 4 tomas al día

35-90 ml de leche reconstituida. Para perros de 10 a 25 kilos de peso adulto, por toma 4 tomas al día

60-120 ml de leche reconstituida. Para perros de 25 a 45 kilos de peso adulto, por toma y 4 toma al día

* **Cuarta semana** : 25-60 ml de leche reconstituida . Para perros de 1 a 10 Kilos en peso adulto, por toma y 4 tomas al día.

45-125 ml de leche reconstituida. Para perros de 10 a 25 kilos en edad adulta, por toma y 4 tomas al día

90-170 ml de leche reconstituida. Para perros de 25 a 45 Kilos en edad adulta, por toma y 4 toma al día

Durante las primeras tres semanas el alimento ha de ser templado antes de cada comida aproximadamente a 37°8ª C.

Después de cada comida, el abdomen debe de aumentar de tamaño, pero no sobre distenderse.

Cuando comienza a utilizarse una leche preparada durante las primeras comidas debe de administrarse una cantidad menor de la inicialmente prescrita. Después se incrementa el volumen gradualmente hasta las dosis recomendadas durante el segundo o tercer día..

La cantidad de alimento debe aumentarse de acuerdo con la ganancia de peso del cachorro. Durante los primeros días será de 5% del peso al nacimiento y cada día.

Siempre administrar con biberón y con animal en posición inclinada (elevant ligeramente las extremidades anteriores y apoyarlas sobre una rulo de toalla o papel).

El agujero de la tetina debe de ser de tal diámetro, que cuando se invierta el bote , la leche caiga lentamente de la tetina. Cuando se alimenta debe de exprimirse una gota de leche hasta el borde de la tetina e introducir esta en la boca del animal. La leche no debe de exprimirse fuera del bote mientras la tetina esta dentro de la boca del cachorro; si se hace esto, se podría provocar una entrada de leche en los pulmones por una mala deglución y provocar serios problemas.

Algunos biberones llevan el orificio de la tetina hecho.

Un aspecto vital en el manejo del huérfano, es la simulación, después de cada comida, de la acción de la lengua de la madre en la región ano-genital, se realiza con una gasa o papel humedecido pasando primero por la vulva o pene y después por el ano.

De esta forma el cachorro miccionará y defecará..

En ocasiones es posible conseguir la misma respuesta acariciando simplemente con el dedo índice a lo largo de la pared abdominal . Esta estimulación debe de hacerse de modo regular después de cada comida cuando se utilice biberón.

Después de alcanzar las tres semanas de edad lo cachorros son capaces de realizarlo por si mismos, sin que sea necesaria estimulación.

Cada semana con una toalla humedecida los cachorros deben de ser lavados, para recordar el mismo lavado que habitualmente les hacen sus madres con la lengua.

La transición desde la leche materna hacia la comida sólida debe de ser un proceso gradual, que se inicia alrededor de las tres semanas, 4 semanas en las razas miniatura, Disponer la comida en un plato poco profundo, acercarla a los labios del cachorro o bien introducir un poco de alimento en la boca

Con 6 semanas de edad del cachorro ya podemos introducir pienso para destete.

El cachorro puede ser separado de la madre cuando ya sepa comer y beber sólo. Nunca antes de las 7 semanas.

Hemos de comprender que el proceso de socialización con la madre y con los hermanos es muy importante para su buen equilibrio de carácter.

Cuando a partir de la 7 semanas ya administramos pienso para cachorro, se le suministra alimento durante 15 a 20 minutos para que coma lo que quiera y después se le retira el resto de la comida. De los cuatro a los seis meses los cachorros han de comer 3 veces al día.