

Los arañazos en zonas inadecuadas

El 81% de los propietarios de gatos manifiestan tener este problema en su casa.

A pesar de que el 75-85% de los hogares con gato tienen rascador el problema de los arañazos en zonas inadecuadas persiste.

¿Por qué no enseñar al gato a redirigir los arañazos al rascador?

¿Por qué no ayudar al gato desde el inicio a aprender a utilizar el rascador?

Te presentamos FELISCRATCH by FELIWAY®

La solución para redirigir los arañazos de los gatos al rascador apropiado, ayudando a los propietarios a mejorar la convivencia y la relación con su mascota.

Qué es Feliscratch de Feliway®

Feliscratch contiene una copia sintética de la **feromona interdigital felina**, feromona que los gatos dejan de forma natural al arañar, y que redirige los arañazos del gato a las superficies donde se haya aplicado el producto.

La **tinción azul de Feliscratch imita el mensaje visual natural** (marcas de arañazos), que contribuye a atraer al gato hacia el rascador.

Feliscratch se presenta en sobres con 9 pipetas. Cada sobre completo equivale a un uso de un mes, el tratamiento completo. Los sobres vienen presentados en **cajas de 4 unidades** para el punto de venta.

Probado científicamente

Feliscratch es la única solución científicamente probada para solucionar problemas de arañazos inapropiados:

- 8 de cada 10 gatos con problemas de arañazos inapropiados responden positivamente al tratamiento de un mes con Feliscratch
- 9 de cada diez gatitos o gatos recién adoptados dirigen sus arañazos al poste del rascador tratado con Feliscratch

¿Cómo se aplica?

1. Coloca en **posición horizontal** el rascador, **apoyado sobre papeles**, o en el fregadero (evitar que pueda manchar).
2. Aplica lentamente el líquido dibujando **2 o 3 líneas** a lo largo del poste.
3. Deja **secar durante unos 5 min.** y vuelve a colocar el rascador en posición vertical.
4. Coloca el rascador cerca de las **zonas en las que el gato arañaba** o cerca de su zona de descanso.

Protocolo de aplicación: 4 semanas

1. Aplicar una dosis (una pipeta) una vez al día durante la 1a semana (7 días seguidos, 7 pipetas).
2. Descansar durante la 2a semana (no aplicar pipetas).
3. Posteriormente aplicar una pipeta al inicio de la 3a semana.
4. Y una pipeta al inicio de la 4a semana.